

الملخص العربي

بالرغم من الأبحاث العديدة التي تناولت العلاقة بين العمل والتغيرات التي تحدث في اللثة، وكذلك بين مرض السكري وتلك التغيرات فإنه لم تجر إلأبحاث قليلة جداً لبيان الآثر المركب للحمل ومرضى السكري على أنسجة اللثة، وتفسیر هذه العلاقة.

لذلك كان الغرض من هذا البحث هو دراسة مستوى كل من الزنك والماغنيسيوم بين السيدات الحوامل المصابات بالسكري والغير معتمدات على الانسولين والمنضبطة علاجيا وبين السيدات الحوامل الغير مصابة بالسكر وبين السيدات الغير حوامل والغير مصابة بالسكري، وأثر هذه المستويات على اللثة والأغشية المحيطة بالأسنان(السمحاق).

وقد أجرى البحث على سبعين سيدة قسمن كالتالي:

المجموعة الأولى :

تشتمل على ثلاثين من الحوامل الأصحاء ينقسمن إلى ٣ مجموعات أخرى:

عشرة سيدات في الشهور الثلاثة الأولى للحمل

عشرة سيدات في الشهور الثلاثة الثانية للحمل.

وعشرة سيدات في الشهور الثلاثة الأخيرة للحمل.

المجموعة الثانية :

تشتمل على ثلاثين من الحوامل المصابة بمرضى السكري الغير معتمدات على الانسولين والمنضبطة علاجيا، وينقسمن إلى ٢ مجموعات أخرى:

عشرة سيدات في الشهور الثلاثة الأولى للحمل

عشرة سيدات في الشهور الثلاثة الثانية للحمل